

WANN MUSS EIN KIND ZU HAUSE BLEIBEN ?



FIEBER ab 38,0 °C

Abgeschlagenheit

Durchfall / Erbrechen

akute Hals- oder Ohrenscherzen

akut auftretener trockener Husten

kein Begleitsymptom einer chronischen Erkrankung



INFEKTIONSSCHUTZ IN MEHREN STUFEN

allgemeine Zugangsvoraussetzungen

Betreuung mit leichtem Schnupfen oder/und gelegentlichem Husten ohne Fieber und ohne Kontakt zu SARS-CoV2 Infizierten

zusätzliche Zugangsvoraussetzungen

Händewaschen

mit Wasser und Seife; Verwendung von Einmalhandtüchern

Händedesinfektion

Abstandsregelung

Interaktion Kinder, Interaktion Kind<->ErzieherIn

Mund-Nasen-Bedeckung

Interaktion Kind<->ErzieherIn

gesamter Austausch der Innenraumluft

regelmäßige mehrminütige Stoßlüftungen

Kohortenbildung

Reduktion der Gruppengröße

Notbetreuung

	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3
	keine oder sehr niedrige Neuinfektionen	niedrige oder leicht ansteigende Neuinfektionen	stetig ansteigende Neuinfektionen
			
		es wird empfohlen: Selbsterklärung der Eltern "48 Std Symthomfrei"	es wird empfohlen: Vorlage eines negativen PCR-Test auf SARS-CoV2
	Kinder , Erwachsene	Kinder , Erwachsene	Kinder , Erwachsene
	ErzieherInnen, Erwachsene	ErzieherInnen, Erwachsene	ErzieherInnen, Erwachsene
	NEIN	NEIN	NEIN
	es wird empfohlen: situationsbedingt für ErzieherIn	es wird empfohlen: für ErzieherIn	es wird empfohlen: für ErzieherIn
	JA	JA	JA
	teil - halboffene Konzepte möglich	JA -> feste Gruppen getrennte Bring-Holzzeiten	JA -> feste Gruppen getrennte Bring-Holzzeiten
	-	JA	JA
	-	JA Vorgaben der SenBJF umsetzen	JA Vorgaben der SenBJF umsetzen